



**Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
(Ν 141(I)/2011)**

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 70 (Έντυπο 12), ημερομηνίας 09/04/2015 για την τροποποίηση υφιστάμενης άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος μετά την έγκριση όλων των δραστικών ουσιών που περιέχονται στο προϊόν και

την επιστολή της εταιρείας BASF Ελλάς ABEE με ημ. 30/03/2015 για τροποποίηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της οριστικής άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ελλάδα,

χορηγείται τροποποιημένη άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **MASAI 20 WP** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

1926

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

20/04/2015

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/10/2019

2. Κάτοχος της άδειας:

BASF ΕΛΛΑΣ ABEE

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Agrolan Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Agrolan Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Masai 20 WP

2. Μορφή: Βρέξιμη σκόνη (WP)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: tebufenpyrad: 20% β/β
βοηθητικές ουσίες: 79,6% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zürich Branch, Ελβετία

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A., Ιταλία

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: 1. S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A., Ιταλία
2. HYDROSOL SRL, Ιταλία

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	1 ή 5 σακίδια μέσα σε χάρτινο κουτί	100γρ.	Χάρτινα κουτιά τα οποία περιέχουν υδατοδιαλυτά σακίδια από Polyvinyl alcohol μέσα σε πλαστική
2	1 ή 2 σακίδια μέσα σε χάρτινο κουτί	250γρ.	
3	1 σακίδιο μέσα σε χάρτινα κουτί	500γρ.	

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: tebufenpyrad

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 98% (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: Notifier και κάτοχος των στοιχείων του παραρτήματος II:
BASF Agro B.V., Arnhem (NL) Zürich Branch, Ελβετία
Κάτοχος της δραστικής ουσίας: Nihon Nohyaku Co., Ιαπωνία.

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Yanai Chemical Industry Co., Ιαπωνία

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης: Ακαρεοκτόνο επαφής και στομάχου εναντίον όλων των κινητών μορφών τετράνυχου και των θερινών αυγών τους

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως μέχρι απορροής

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίζουμε κατά το 1/3 το ψεκαστικό βυτίο και ρίχνουμε τον απαιτούμενο αριθμό υδατοδιαλυτών σάκων χωρίς να τους ανοίξουμε. Στη συνέχεια γεμίζουμε το ψεκαστικό με νερό υπό συνεχή ανάδευση. Το σκεύασμα είναι διαβρωτικό στον ορείχαλκο και τον μαλακό χάλυβα.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ./δεκ. μέγιστη		
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά Λεμονιά Μανταρινιά Γκρεϊπ φρούτ	Κόκκινος Τετράνυχος (Panonychus citri)	25 – 50	200 – 400	100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής	1 εφαρμογή
Αμπέλι	Κόκκινος Τετράνυχος (Panonychus ulmi)	41,5 – 250	20 – 120	50		
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά Νεκταρινιά	Κόκκινος Τετράνυχος (Panonychus ulmi)	43,5 – 65	100 – 150	65		
Δαμασκηνιά	Κόκκινος Τετράνυχος (Panonychus ulmi) Κίτρινος Τετράνυχος (Tetranychus urticae)	43,5 – 81,5	80 – 150	65		
Αγγούρι Αγγουράκι Κολοκύθι (αγρού και θερμοκηπίου)	Κίτρινος Τετράνυχος (Tetranychus urticae)	100	100	100		
Πεπόνι, Καρπούζι (Θερμοκηπίου)	Κίτρινος Τετράνυχος (Tetranychus urticae)	100	100	100		
Μηλοειδή Μηλιά Αχλαδιά	Κόκκινος Τετράνυχος (Panonychus ulmi)	33,5 – 250	20 – 150	50		
Οι ακόλουθες χρήσεις θα χορηγηθούν μετά τον καθορισμό κοινοτικών Ανωτάτων Ορίων Υπολειμμάτων						
Τομάτα, Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου)	Κίτρινος Τετράνυχος (Tetranychus urticae)	66,5 – 100	100 – 150	100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής	1 εφαρμογή
Πιπεριά (Θερμοκηπίου)	Κίτρινος Τετράνυχος (Tetranychus urticae)	66,5 – 100	100 – 150	100		
Φράουλα (θερμοκηπίου)	Κίτρινος Τετράνυχος (Tetranychus urticae)	100	100	100		

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Αμπέλι, Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά)	14 ημέρες
Δαμασκηνιά	21 ημέρες
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) Εσπεριδοειδή,	7 ημέρες
Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, (Υ&Θ) Πεπόνι, Καρπούζι (Θ)	3 ημέρες
<i>Μετά τον καθορισμό κοινοτικών Ανωτάτων Ορίων Υπολειμμάτων</i>	
Τομάτα, Μελιτζάνα, Φράουλα (Θ)	3 ημέρες
Πιπεριά (Θ)	14 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: **21A**

ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΕΚΑΣΤΕΣ

Το σκεύασμα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες ανοιχτού αγρού μόνο με τρακτέρ εφοδιασμένα με κλειστή καμπίνα.

Κατά την διάρκεια της παρασκευής του ψεκαστικού υγρού και την ανάμειξη θα πρέπει οι επαγγελματίες ψεκαστές να φοράνε γάντια, φόρμα, παπούτσια και καπέλο

Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στον αγρό που έχει ψεκαστεί πριν οι ψεκασμένες επιφάνειες των φύλλων να έχουν στεγνώσει πλήρως. Οι εργάτες οι οποίοι εισέρχονται σε ψεκασμένες καλλιέργειες αμπελιού με MASAI για καλλιεργητικές φροντίδες ή συγκομιδή, θα πρέπει να φορούν γάντια και φόρμα εργασίας.

Οι εργάτες που εισέρχονται σε ψεκασμένες με MASAI καλλιέργειες εσπεριδοειδών δεν πρέπει να παραμένουν/εργάζονται για περισσότερο από 6 ώρες.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής το MASAI 20WP δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα

10. Συνδυαστικότητα:

11.Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07



GHS09

12. Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

13. Δηλώσεις προφύλαξης:

P102 Μακριά από παιδιά

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν

P264 Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι σχολαστικά μετά τον χειρισμό

P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

P301 + P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία

P304 + P340 – ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετέ τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε το να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

P330 Ξεπλύνετε το στόμα.

P403 + P233 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.

SP1 Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

- Εσπεριδοειδή: 20 μέτρα

- Αμπέλι: 10 μέτρα

- Δαμασκηιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά: 30 μέτρα ή 20 μέτρα με χρήση ακροφυσίων χαμηλής διασποράς 75%

- Μηλιά, Αχλαδιά: 20 μέτρα

- Κηπευτικά: 5 μέτρα

EUH 208 Περιέχει tebufenpyrad. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και κατόπιν πιείτε άφθονο νερό, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην προκαλέσετε εμετό εκτός και αν σας υποδειχθεί από το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή από ιατρό. Ποτέ μην προκαλείτε εμετό ή χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα όταν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του ή εκδηλώνει σπασμούς.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως τα προσβεβλημένα μάτια για τουλάχιστον 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό με τα βλέφαρα μονίμως ανοιχτά, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση εισπνοής, διατηρήστε τον ασθενή ήρεμο, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό, ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Διατηρείστε το στην αρχική του συσκευασία, καλά κλεισμένη, σε μέρος δροσερό καλά αεριζόμενο, ξηρό και σε θερμοκρασία κάτω των 40°C, μακριά από πηγές θερμότητας, ανοικτή φλόγα ή σπινθήρα. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με σχίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία:20/04/2015.....

.....
(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα